

黑枕黄鹂在我国的春季迁徙

THE SPRING MIGRATION OF THE BLACK-NAPED ORIOLE OVER CHINA

(一) 黑枕黄鹂 (*Oriolus chinensis diffusus*) 北迁时在四川的首见日期

根据十年来在四川雅安的系统观察和省内地市的零星记录, 将此鸟北迁时途经四川的首见日期分别列示如表 1 和表 2。

表 1 黑枕黄鹂北迁时在雅安的首见日期

年份	1958	1962	1973	1974	1977	1978	1979	1980	1981	1982
月	4	4	5	4	5	4	4	4	5	3
日	27	5	4	27	19	30	27	27	18	24

表 2 黑枕黄鹂北迁时在四川各地的首见日期

地点	宝兴	成都	灌县*	峨眉	乐山**	马边	宜宾
年份	1981	1956	—	—	1941	1977	1964
月	4	4	4	4	4	4	4
日	25	17	24	26	30	28	30

* 据 Stresemann (1924), ** 据武汉大学采集记录

从表 1 可见, 在 10 年期间, 黑枕黄鹂北迁时最早到达雅安的时间为 3 月下旬, 最晚为 5 月中旬, 其余除两年分别为 4 月和 5 月初旬外, 有 5 年的首见日期均为 4 月 27—30 日。从表 2 说明, 在四川其他地区, 除成都的首见日期为 4 月中旬外, 其余各地均在 4 月 24—30 日间。由此可见, 黑枕黄鹂北迁途经四川的首见日期似乎比较稳定, 一般多在 4 月下旬。

(二) 黑枕黄鹂北迁时在国内各地的首见日期

根据目前掌握的资料, 明确记录有黑枕黄鹂迁见日期的共有 130 余个地区和采集或观察点, 我们再将这一系列工作中, 选定各地最早的迁见日期作为讨论研究的基础, 结果列示如表 3。

现将上表所示首见日期相近的各地, 用线条连接起来, 可以清楚地看到大概有下列几条北迁时的等候线(如图), 即:

1. 4 月上、中旬见于贵州册亨、广西柳州和桂林、广东清远和福建邵武一带。
2. 4 月下旬见于四川大部、贵州赤水 and 黄定、湖南武冈和江华、江西新余和上海市一带。
3. 5 月上旬见于甘肃兰州和临洮、陕西秦岭太白山和武功、湖北武汉、安徽祁门和黟县海晏山、江苏南京和盐城, 北至山东济南、河北昌黎和辽宁旅大市一带。

(下转第 318 页)

本文 1983 年 1 月 24 日收到, 1983 年 9 月 30 日收到修改稿。

(上接304页)

表3 黑枕黄鹑北迁时在国内各地的首见日期*

观察或采集地	北京		河北		山西		内蒙古		黑龙江		吉林		辽宁		山东		江苏		上海		安徽		浙江		江西		福建		河南	
	年	月	日	察	岛	太原	察	察	尚志	哈尔滨	梨树	长白山	旅大	济南	南京	盐城	上海市	祁门	蚌埠	滁县	歙县	休宁	黟县	歙县	黟县	歙县	黟县	歙县	黟县	
1968	1964	1953—54			1962	1964	1966	1960	1980	1980	1982	1963	1972																	
3	5	5	5	5	6	6	4	6	5	6	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
30	20	初	中	12	7	10	18	2	29	3	15	15	3	1	8	27	9	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	


续表3

观察或采集地	湖北		湖南		广东		广西		陕西		宁夏		甘肃		四川		贵州		云南		海南				
	武	汉	武	汉	清	广	桂	柳	太	武	中	兰	临	洮	册	亦	贵	勤	果	孟	河	盈	永		
1947	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	6	5	5	5	4	4	4	1	4	3	2	4	5	4	
月	3	24	26	3	4	15	18	7	2	12	2	2	2	2	24—30	5	21	28	23	8	14	13	22	26	21
日																									

* 所列首见日期,除引自文献外,还根据王岐山、王祖祥、龙通宗、刘作敏、纪加义、陈维平、吴至康、李汉华、周世铸、赵正阶、常家传、蔡其恒、黎松武和魏天恩等同志提供的采集和观察记录,谨此表示衷心感谢。

(下转第352页)

(上接318页)



黑枕黄鹂北迁首见日期等候线

I. 示4月上、中旬; II. 示4月下旬; III. 示5月上旬; IV. 示5月中旬; V. 示6月中旬。

4. 5月中旬见于北京市、河北承德和秦皇岛、吉林梨树和长白山一带。

5. 6月中旬见于内蒙古额济纳旗、宁夏中卫、山西太原和河南一带。

从上述迁飞情况看, 似乎说明黑枕黄鹂春季北迁时, 是在大面积范围内同时进行的, 当属宽面迁徙类型。另一方面, 根据我们前后12年(1959, 1963—65, 1973—75, 1977—80, 1982)在凉山彝族自治州(包括原西昌地区)的鸟类区系调查表明, 除该州东北部的雷波、马边和峨边曾见有黑枕黄鹂的分布外, 其余广大的四川西南部均没有发现过该鸟的痕迹。联系在云南境内, 除东北部永善等地有此鸟的记录外, 广大的滇西北地区, 均未见有分布。由此可以说, 横断山脉地区, 很可能不是黑枕黄鹂普通亚种迁飞时的通道。

李桂垣 (Li Guiyuan) (四川农学院)